



máxima
medisch centrum

Injectie van medicatie in heup- of schoudergewricht

Afdeling radiologie

De injectie van medicatie in uw gewricht vindt plaats op:

Neemt u uw servicepas mee?

U heeft met uw medisch specialist afgesproken dat u binnenkort een injectie van medicatie in heup- of schoudergewricht krijgt. In deze folder wordt uitgelegd hoe de punctie verloopt. Soms kan het in uw situatie iets anders zijn.

Injectie van medicatie in heupgewricht

Bij een injectie van medicatie spuit de radioloog een vloeistof in het heupgewricht. Bij een volgende afspraak vraagt uw specialist u of, en hoe, uw pijngevoel veranderd is.

Injectie van medicatie in schoudergewricht (AC)

Het AC gewricht (acromio clavulaire) is het gewricht tussen het sleutelbeen en het schouderblad.

Bij een injectie van medicatie spuit de radioloog een vloeistof in dit gewricht. Bij een volgende afspraak vraagt uw specialist u of, en hoe, uw pijngevoel veranderd is.

Voor de behandeling

In overleg met uw medisch specialist stopt u één week voor de behandeling met het innemen van pijnstilling.

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bespreek dit vooraf met uw medisch specialist. In overleg stopt u (tijdelijk) met het gebruik hiervan.

De behandeling

De behandeling vindt plaats met behulp van echografie (onderzoek dat gebruik maakt van geluidsgolven).

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. Er wordt gel op de huid van heup of schouder gebracht. Deze gel zorgt dat de geluidsgolven goed door de huid gaan. Met de

echografie maakt de radioloog heup- of schoudergewricht zichtbaar.

De heup of schouder wordt steriel afgedekt. Het gewricht wordt aangeprikt. Met echografie wordt de naald in de goede positie gebracht. De radioloog spuit dan een vloeistof in het gewricht. Deze vloeistof kan een drukkend gevoel in het gewricht veroorzaken. Na het inspuiten verwijdert men de naald. De laborant(e) verzorgt de punctieplaats.

Duur behandeling

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling kan een kleine bloeding ontstaan op de plaats van de punctie. Omdat we een lokale verdoving toepassen, adviseren wij u niet zelf auto te rijden. De kracht in uw been of arm kan tijdelijk minder zijn. Verder kan er een doof gevoel in been of schouder ontstaan.

Krijgt u een injectie in de heup dan adviseren wij u ook niet zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer.

Bij een volgende afspraak vraagt uw specialist u of, en hoe, uw pijngevoel veranderd is en wordt bekeken of de pijnstilling weer wordt opgestart.

Als u gestopt bent met bloedverdunnende medicijnen dan kunt u, in overleg met uw behandelend arts, weer beginnen met het innemen hiervan

Belangrijke telefoonnummers

- Heeft u vragen over de behandeling zelf, dan kunt u bellen met afdeling radiologie, telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Heeft u andere vragen neem dan contact op met uw medisch specialist, die het onderzoek heeft aangevraagd.
- Bent u verhinderd bel dan zo snel mogelijk, met de afdeling radiologie op telefoonnummer (040) 888 90 00.
- Heeft u opmerkingen over deze informatiefolder. Noteert u die in deze folder en geef deze folder af aan de receptie van de radiologie.

Hoe tevreden bent u over uw arts, specialist of ziekenhuis?
Geef uw mening over MMC op ZorgkaartNederland.nl



Máxima Medisch Centrum
www.mmc.nl

Locatie Eindhoven:
Ds. Th. Fliednerstraat 1
Postbus 90 052
5600 PD Eindhoven

Locatie Veldhoven:
de Run 4600
Postbus 7777
5500 MB Veldhoven

Telefoonnummer : (040) 888 88 00

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.