Cryo-behandeling van de perifere zenuw

Vanwege klachten door een beklemming/irritatie van een zenuw is samen met uw behandelend arts besloten om een cryo-behandeling te verrichten.

Wat is een cryo-behandeling?

Met een speciale naald wordt de aangedane zenuw opgezocht. Door dit deel van de zenuw met cryo (bevriezing met koolzuurgas) te behandelen, wordt de pijnprikkel geremd en gaat u minder pijn ervaren.

De behandeling

U neemt plaats op de behandeltafel in de behandelkamer. De plaats van injectie wordt gedesinfecteerd en plaatselijk verdoofd. Met behulp van echobeelden brengt de pijnspecialist de naald naar de gewenste plaats. Als de naald op de goede plek staat, wordt de zenuw gedurende enkele minuten door bevriezing met koolzuurgas behandeld.

Complicaties en bijwerkingen

Ondanks alle zorg die aan de behandeling wordt besteed, kunnen er complicaties optreden in de vorm van:

- Tijdelijk krachtsverlies of een doof gevoel.
- **Na de behandeling kunt u nog pijn hebben. Deze napijn kan een paar dagen tot ongeveer een week duren, maar gaat meestal vanzelf over. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller gebruiken.**

Resultaat

U kunt binnen een paar dagen al merken dat de behandeling werkt. Het beste resultaat zien we meestal na 2 tot 3 weken.

Rond deze tijd krijgt u van ons een vragenlijst per e-mail. Hierin kunt u aangeven wat het effect van de behandeling is. Als dat nodig is, plannen we daarna een telefonische afspraak. Dan bespreken we het resultaat en of verdere behandeling nodig is.

Wij vragen u om te wachten met contact opnemen tot u de vragenlijst (na ongeveer 3 weken) heeft ingevuld.

Heeft u klachten zoals koorts of minder kracht? Neem dan eerder contact met ons op.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Let op

- Informeert u ons alstublieft vóór de behandeling bij een (mogelijke) zwangerschap.
- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Bespreek dan met de pijnspecialist of en hoe lang van tevoren u moet stoppen met de bloedverdunners.
- Na de behandeling mag u dezelfde dag niet actief aan het verkeer deelnemen. U zorgt zelf voor vervoer.
- Bent u allergisch voor medicatie, meld dit vóóraf.
- U mag dezelfde dag de pleister verwijderen die op uw huid geplakt is na de behandeling.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Pijngeneeskunde, telefoonnummer: (040) 888 5121. Kijk voor de telefonische openingstijden van de polikliniek op: https://www.mmc.nl/afdelingen/pijngeneeskunde/

Bent u verhinderd neem dan, uiterlijk 24 uur voor uw afspraak, contact met ons op.