Punctie/drainage onder echogeleide

borst (thorax/longen)
buik (abdomen/organen)

In overleg met uw behandelend arts is er een punctie of drainage onder echogeleide afgesproken. In deze folder krijgt u uitleg hoe de behandeling verloopt.
Het kan zijn dat het in uw situatie anders is.

Voor deze behandeling meldt u zich op de afdeling dagbehandeling.
Uw afspraak is op locatie Veldhoven.

Wat is een punctie?
Bij een punctie wordt onder plaatselijke verdoving een klein stukje weefsel weggehaald voor onderzoek in het laboratorium.

Wat is een drainage?
Bij een drainage wordt onder plaatselijke verdoving een slangetje ingebracht in de ruimte waar het af te voeren vocht zich bevindt.

Voorbereiding
Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Bespreek dit vooraf met uw behandeld arts. In overleg stopt u (tijdelijk) hiermee.

Voor de behandeling
Op de dag van de behandeling moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u niet mag eten of drinken. U meldt zich op de afdeling dagbehandeling. Op de afdeling wordt zo nodig bloed geprikt om de stollingsfactor te bepalen. Ga voor de behandeling naar het toilet. Tijdens de behandeling is dit namelijk niet mogelijk. U gaat met bed naar de afdeling Radiologie.

De behandeling
Tijdens de behandeling blijft u in bed liggen. Afhankelijk van de plaats waar weefsel of vocht wordt weggenomen gaat u op buik of zij liggen. Met echografie bepaalt de radioloog de juiste plaats. Daarna wordt de huid schoongemaakt, steriel afgedekt en plaatselijk verdoofd. Ondanks de verdoving kan de behandeling pijnlijk zijn. Zo nodig kan de radioloog nog wat verdoving toedienen, als u het aangeeft. Vrijwel alle patiënten geven aan dat de pijn goed te houden is.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Punctie
Met echografie brengt de radioloog de punctienaald op de juiste plaats in. De radioloog haalt met deze naald een klein stukje weefsel uit het te onderzoeken gebied. Het kan zijn dat er meerdere malen geprikt moet worden om voldoende weefsel te krijgen.

Drainage
Met echografie brengt de radioloog de punctienaald met een speciaal slangetje in de met vocht gevulde ruimte. Als de naald op de goede plaats zit, wordt de naald eruit gehaald. Het slangetje wordt met een speciale pleister op de huid geplakt. Hieraan wordt een opvangzakje bevestigd. In dit zakje loopt het vocht.

Duur van de punctie/drainage
De totale behandeling duurt ongeveer 30 minuten.

Na de punctie/drainage
- Na de behandeling blijft u in bed liggen:
  - na een punctie in de buik/long 2 uur
  - na drainage 1 uur
- Zo nodig wordt er een controlefoto gemaakt.
- Uw bloeddruk, hartslag en punctieplaats worden gecontroleerd.
- Na de behandeling mag u het eerste uur nog niet eten en drinken.
- Bij pijn kunt u om een pijnstiller (Paracetamol) vragen.
- Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, begin dan in overleg met uw behandelend arts weer met het innemen hiervan.
- Na de voorgeschreven rustperiode gaat u weer naar huis. In sommige gevallen blijft u een nacht.
- Uw behandeld arts bepaalt wanneer de drain verwijderd mag worden.

Adviezen voor thuis
- De eerste twee dagen doet u thuis rustig aan.
- Gebruik pijnstillers (paracetamol) bij pijnklachten.
- Na een longpunctie kunt u in de loop van de dag wat bloed ophoesten. Een beetje bloed is normaal.
- Na een leverpunctie kunt u lichte pijn trekkend naar uw rechterschouder voelen.

Uitslag van de behandeling
Uw behandelend arts informeert u over de uitslag tijdens een vervolgafspraak.

Risico's en complicaties

De risico's en complicaties die kunnen optreden tijdens of na de behandeling zijn afhankelijk van de plaats van de punctie/drainage.
Zeldzame complicaties zijn:

- pneumothorax (klaplong)
- (na)bloedingen
- ernstige pijn, met name bij het ademhalen
- het benauwd krijgen
- duizelig worden
- het ontstaan van een grote bloeduitstorting bij de punctieplaats
- zich helemaal niet goed voelen
- ernstige ongerustheid

Neem bij bovenstaande klachten contact op met de polikliniek van uw behandelend arts of met de afdeling Radiologie.

Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende Hulp, locatie Veldhoven, telefoonnummer (040) 888 8811.

Waardevolle bezittingen

Het ziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen in en uitlopen. Grote geldbedragen, pasjes, kostbare sieraden en andere waardevolle bezittingen kunt u beter thuislaten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal.

Belangrijk

- Kijk voor de telefonische bereikbaarheid van de afdeling Radiologie op: www.mmc.nl/afdelingen/radiologie-en-nucleaire-geneeskunde.
- Heeft u vragen over het onderzoek zelf?
  Bel dan met de afdeling Radiologie, telefoonnummer (040) 888 9000.
- Heeft u andere vragen?
  Neem dan contact op met uw behandelend arts, die het onderzoek heeft aangevraagd.
- Bent u te laat op de afspraak?
  Dan bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe afspraak moet maken.
- Bent u verhinderd?
  Bel dan zo snel mogelijk met de afdeling Radiologie om een nieuwe afspraak te maken.