Candesartan

Medicatie om migraineaanvallen te verminderen

Deze informatiefolder geeft u slechts een beknopt informatieoverzicht over uw medicijn. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de bijsluiter en het advies van uw arts en apotheker.

Wat heeft u gekregen?

U heeft candesartan voorgeschreven gekregen. Dit is een medicijn dat bedoeld is om uw migraine in de toekomst te verminderen. Het doel is om de ernst en het aantal migraineaanvallen te verminderen. Candesartan wordt ook gebruikt bij de behandeling van de bloeddruk en hartfalen.

Afhankelijk van de frequentie en variatie van uw migraineklachten kan pas na een bepaalde periode een uitspraak worden gedaan over het effect. De duur van deze periode bespreekt u met uw arts.

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

Bij ernstige lever- of gal(weg)ziekten of -stoornissen, ernstige hartklepstenosen en/of vernauwingen van nierslagaders.

Gebruiksaanwijzingen

U neemt dit medicijn dagelijks in. Afhankelijk van de dosering is dat eenmaal of tweemaal daags. Dit hoort u van uw arts en leest u op het recept en/of medicijndoosje.

Met uw arts bespreekt u of, en wanneer de dosering aangepast moet worden. Bij (hinderlijke) bijwerkingen, dient u het ophogen eerst met uw arts te bespreken. Bijwerkingen kunnen door gewenning na 1-2 weken verminderen. Het effect kan pas na minimaal 3 maanden goed worden beoordeeld.

De maximale dosering voor migraine is 32 mg per dag.

Bijwerkingen

Candesartan geeft over het algemeen weinig bijwerkingen. Een aantal van de mogelijke bijwerkingen die kunnen optreden zijn: duizeligheid en soms misselijkheid. Leest u voor het volledige overzicht uw bijsluiter.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

Kunt u er andere medicatie naast gebruiken?

Het is van belang dat u bij uw arts en apotheker aangeeft welke andere medicatie u neemt en de bijsluiter goed leest. Pas op met de combinatie met andere bloeddrukverlagers en NSAID's (Ibuprofen, Naproxen en/of Diclofenac): het kan dan soms nodig zijn uw bloeddruk, nierfunctie en zouten in het bloed vaker te laten controleren. Ook de combinatie met heparine of het antibioticum cotrimoxazol kan het kaliumgehalte doen toenemen. Het kaliumgehalte dient dan gecontroleerd te worden, met name bij klachten zoals spierzwakte en een hartritmestoornis. Bij bekende nierziekten, hartfalen, suikerziekte en/of wanneer u ouder bent dan 70 jaar dient de nierfunctie en het kaliumgehalte na een week gecontroleerd te worden.

Zwangerschap

Tijdens zwangerschap dient het middel niet gebruikt te worden in verband met een verhoogde kans op groei- en aanlegstoornissen bij het ongeboren kind. De bijsluiter toont een volledig overzicht van risico's en mogelijke gevolgen.

Autorijden

Dit medicijn heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

Welke soorten en merken candesartan zijn er geregistreerd voor migraine?

o candesartan, Atacand®