Hypospadie nazorg na verband verwijderen

Vandaag is het verband en de katheter verwijderd. De nacontrole bij de kinderuroloog vindt plaats over ongeveer 6 weken. Vervolgens komt uw kind in een follow-up traject. Er vinden dan controles plaats na 6 maanden, 1 jaar en op de leeftijd van 5, 10 en 15 jaar. De urinestraal blijft dan nog gecontroleerd doormiddel van een plastest.

De medicatie Dridase (merkzaam Oxybutinine) mag gestopt worden.

Adviezen en leefregels

De eerste week moet uw kind nog rustig aan doen, daarom raden wij het af om gebruik te maken van het kinderdagverblijf of school. Na de eerste week mag dit wel, zodra het kinderdagverblijf of school goede instructies heeft gehad van u als ouders.

Gedurende 6 weken na de operatie mag uw kind niet zwemmen, niet in het zand spelen, sporten, op een loopfietsje of zadel zitten en niet bij u op de fiets en in de bakfiets.

Voorkom irritatie en/of infectie

Om de kans op irritatie of infectie te voorkomen is het belangrijk om uw kind vaker te verschonen. Verwissel een natte luier sneller als normaal en zeker als uw kind ontlasting heeft gehad is het van belang om de luier direct te verschonen.

Soms moet het verband eerder verwijderd worden omdat er ontlasting onder is gekomen, dat is niet erg. Het verband is vooral belangrijk in de eerste 24 uur na de operatie. In die periode geeft het wat extra comfort. Nadat het verband is verwijderd, wordt er geen nieuw verband aangebracht, omdat de wond dan niet opnieuw gedesinfecteerd kan worden. Voor een goede genezing na de operatie is het belangrijk dat u op een aantal zaken let tot u op nacontrole komt met uw kind. Dat is rond de 6 weken na de operatie.

- Uw kind mag dagelijks in bad of onder de douche. Gebruik lauw tot warm water met een beetje babyshampoo. Gebruik **geen** badolie, dat maakt de wond te week. Uw kind mag maximaal 5 minuten douchen.
- Het geopereerde gebied kunt u droogdeppen met een schone handdoek, hydrofiele doek of aan de lucht laten drogen.
- De billen mag uw schoonmaken met billendoekjes tot aan de basis van de penis. Veeg altijd van voor naar achteren, dus vanuit de basis van de penis naar de billen toe.
- Als uw kind nog niet zindelijk is, kunt u hem na de ontlasting eventueel een keer extra wassen onder de douche of in bad.

De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar.

- Smeer geen zalf, poeder of olie op het geopereerde gebied.
- Voorkom druk op de wond.
- In de eerste week na het verwijderen van het verband en de katheter kunnen er dubbele luiers worden gebruikt. Daarna kunt u hiermee stoppen.
- Na 1 week mag uw kind weer naar de kinderopvang of school, met goede uitleg en instructies aan de pedagogisch medewerker.

We raden aan contact op te nemen met de polikliniek urologie als:

- Uw kind koorts krijgt.
- De pijn niet verdwijnt na gebruik van paracetamol.
- De wond er rood uitziet.
- Er bloed uit de wond komt.
- Het wondgebied gaat zwellen.
- De wond gaat ontsteken: de wond wordt dan rood, warm, pijnlijk en gaat rieken.
- Er onvoldoende urineproductie is. Uw kind heeft dan een volle blaas. Dit kunt u controleren door te voelen of de onderbuik hard is.
- Uw kind 3 dagen na het verwijderen van de katheter pijn houdt bij het plassen.

Mogelijke complicatie

Bij elke operatie kunnen complicaties voorkomen, zo ook bij een hypospadie operatie. Meestal verloopt deze operatie zonder problemen. Bij ongeveer 1 op de 5 kinderen is een vervolgoperatie nodig. De kans op complicatie is bij een ernstige vorm van hypospadie groter dan bij een lichte vorm. Complicaties kunnen optreden tijdens de gehele groeifase van een kind, maar de meeste complicaties treden vrij kort na de operatie op.

De meest voorkomende complicaties zijn:

- Wondinfectie. Zoals bij elke operatie kan er een infectie optreden. Vaak is dit met antibiotica te behandelen. Bij ernstige infecties kan soms de nieuw aangelegde plasbuis weer openvallen en moet er later opnieuw een operatie plaatsvinden.
- Een hypospadie correctie is zeer verfijnde chirurgie en daarmee ook kwetsbaar voor complicaties. Bij 10% tot 30% treden complicaties op zoals het openvallen van de wond of het ontstaan van een fistel traject (een verbinding tussen de huid en plasbuis waar ook urine uit kan komen).
- Vernauwing van de plasbuis. Hierdoor kan het plassen moeilijker gaan met een slechtere straal.

Bij vragen of problemen kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de polikliniek Urologie via 040 – 888 8390.

Bij problemen zoals koorts of een wondinfectie in de avond- of nachturen en weekenden kunt u binnen 2 weken na de operatie contact opnemen met de Spoedeisende hulp via 040 – 888 8811.