

## Follow up na mammacarcinoom of DCIS voor vrouwen en mannen Borstcentrum Máxima MC

Follow up schema na borstsparende behandeling en ablatio mammae (Bron: richtlijnen database)

| Leeftijd ten tijde van follow up | Tijd na operatie |               | Modaliteit van onderzoek             |
|----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|
| < 40 jaar                        | ≤ 3 jaar         |               | Jaarlijks MRI                        |
|                                  | > 3 jaar         | Densiteit A/B | Jaarlijks XMG tot 40e                |
|                                  |                  | Densiteit C/D | Jaarlijks MRI tot 40e                |
|                                  | > 10 jaar        |               | 2-jaarlijkse follow up*              |
| 40-49 jaar                       | ≤ 3 jaar         |               | Jaarlijks XMG                        |
|                                  | > 3 jaar         |               | Jaarlijks XMG tot 50e                |
| 50-75 jaar                       | ≤ 3 jaar         |               | Jaarlijks XMG                        |
|                                  | > 3 jaar         |               | 2-jaarlijks XMG t/m 75e              |
| > 75 jaar                        | ≤ 3 jaar         |               | Jaarlijks XMG tot 3 jaar na diagnose |
|                                  | > 3 jaar         |               | --                                   |

\*Modaliteit op geleide densiteit/advies van de radioloog

### Opmerkingen op bovenstaande tabel:

- Indien een patiënt een borstsparende behandeling heeft ondergaan, kan zij na 3 jaar, mits > 50 jaar, mammografisch onderzoek laten verrichten om de 2 jaar via het ziekenhuis waar patiënt tot dan toe werd gecontroleerd waarbij de uitslag via de huisarts kan worden doorgegeven.
- Indien een patiënt een ablatio heeft ondergaan en indien > 50 jaar, kan zij na 3 jaar, worden terugverwezen naar het BVO voor mammografische screening van de contralaterale borst.
- Voor mannen na de diagnose mammacarcinoom geldt dezelfde chirurgische follow up als voor vrouwen, echter hoeven zij na ontslag follow up ziekenhuis niet verder opgevolgd te worden.

### Uitzonderingen op bovenstaande tabel:

- Pat. die binnen studie-verband langer in de follow up moeten blijven.
- Pat. met dubbelzijdige ablatio mamma chirurgische follow up, jaarlijks voor lichamelijk onderzoek gedurende 3 jaar (ongeacht leeftijd en adjuvante hormonale therapie).

- Pat. met adjuvante hormonale therapie: binnen het Borstcentrum is ervoor gekozen om pat. gedurende deze behandeling in follow up te houden, ook met beeldvorming.

2x per jaar controle: eenmaal per jaar door chirurg/VS met beeldvorming (volgens tabel) en 1x per jaar controle i.v.m. hormonale therapie door internist-oncoloog/VS.

Indien pat. eerder stopt met de hormonale therapie, moet het follow up schema zoals in bovenstaande tabel opgepakt worden.

#### Rapportage en communicatie

- Afspraken m.b.t. follow up controles worden met de patiënt door de VS tijdens het nazorggesprek gecommuniceerd en vastgelegd in de 'samenvatting' van chirurgisch en (indien van toepassing) interne dossier.

Follow up schema voor patiënten met een hoog risico op een tweede primair mammacarcinoom in follow-up zowel na borstsparende therapie als na ablatie van de aangedane mamma (Bron: richtlijnen database)

Onder deze hoog risicogroep vallen:

- Patiënten die thorax-/okselbestraling hebben ondergaan < 40e levensjaar
- Dragerschap genmutatie in BRCA1\*, BRCA2\*, PALB2\*, PTEN en TP53-genmutatie
- Draagsters van twee pathogene CHEK2- genmutaties (homozygoot)
- Draagsters van de c.7271T>G mutatie in het ATM-gen.
- Vrouwen met een andere pathogene genmutatie waarbij (op basis van CanRisk) het LTR geschat wordt op tenminste 50%.

| Leeftijd ten tijde van follow-up | Frequentie |               | Modaliteit van onderzoek |
|----------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| < 40 jaar                        | Jaarlijks  |               | MRI                      |
| 40-49 jaar                       | Jaarlijks  |               | MRI + 2-jaarlijks XMG    |
| 50-59 jaar                       | Jaarlijks  |               | MRI + 2-jaarlijks XMG    |
| 60-75 jaar                       | Jaarlijks  | Densiteit A/B | XMG                      |
|                                  |            | Densiteit C/D | Afwisselend XMG en MRI   |
| >75 jaar                         | Jaarlijks  |               | XMG gedurende 3 jaar     |